

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 20-5-80320520

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PERIODIQUE

EDITION DE LA STATION "MIDI-PYRENEES"

(ARIEGE, AVEYRON, HAUTE-GARONNE, GERS, LOT,
HAUTES-PYRENEES, TARN, TARN-ET-GARONNE)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Rue St-Jean prolongée - B.P. n° 20 - 31130 BALMA - (Tél. 24.06.51)

ABONNEMENT ANNUEL

S/Rég. recettes Dir. Dép. Agri. Hte-Gne
C.C.P. 8612-11 R TOULOUSE

- BULLETIN TECHNIQUE N° 163 - EDITION GRANDES CULTURES -

14 mai 1980

CEREALES D'HIVER

Stade moyen des blés : 10 (dernière feuille sortie, épi gonflé) à 10-1 (premiers épis visibles).

Stade moyen des orges : 10-3 à 10-5 (pleine épiaison) à 10-5-1 (début floraison).

- SUR BLE :

1.- MALADIES -

Septoriose et Rouille Brune sont les deux maladies du feuillage à surveiller.

La Septoriose (provoquée par *Septoria tritici* le plus généralement, mais *Septoria nodorum* est également observé) a sensiblement évolué et gagne parfois les trois dernières feuilles.

La Rouille brune a progressé ces dernières semaines. Elle est actuellement présente dans 20 % des champs sur le feuillage de la base et est notée sur les trois dernières feuilles dans 10 % des cas.

Une intervention fongicide au stade "épiaison", lorsque la moitié au moins des épis sera sortie (stade 10-3), sera justifiée lorsque ces maladies seront observées sur la feuille n° 3 (3ème feuille en partant de l'épi).

Le choix des produits tiendra compte des maladies observées :

- Septoriose seulement :

Chlorothalonil (DACONIL à 1,5 kg/ha),
Captafol + Carbendazime (CERETAL LIQUIDE à 2 l/ha),
Captafol + Ethirimol (MILCAP à 4 l/ha),
Carbendazime + Fenarimol + Manèbe (RIMIDINE PLUS à 2,5 kg/ha).

- Rouille Brune seulement :

Triadimefon (BAYLETON 25 à 0,5 kg/ha),
Manèbe + Tridémorphe (CALIXINE M à 5 kg/ha).

P. 14

- Septoriose et Rouille Brune associées :

Captafol + Triadiméfon (BAYLETON CF EPI à 2 kg/ha),
 Carbendazime + Mancozèbe (EPIDOR P à 3,7 kg/ha, MILKUR à 4,3 ka/ha,
 KOMBAT à 3 kg/ha),
 Carbendazime + Manèbe (nombreuses spécialités),
 Carbendazime + Manèbe + Soufre (BRONX à 5 kg/ha, GERBEL à 5 kg/ha),
 Carbendazime + Triadiméfon (BAYLETON TOTAL à 1 kg/ha),
 Manèbe + Méthylthiophanate (PELTAR à 3 kg/ha),
 Manèbe + Soufre (TRIAL à 17 kg/ha, SILODOR à 13,5 kg/ha),
 Manèbe + Triforine (SAPROL M à 2 kg + 1,5 l/ha),
 CGA 64250 (TILT 125 à 1 l/ha),
 Carbendazime + Manèbe + Tridémorphe (BAVICAL F à 6,25 kg/ha).

Remarques sur les autres maladies.

La Fusariose sur la base présente une certaine importance dans 30 % des cas.

L'Oïdium est très rarement présent sur les dernières feuilles.

Un cas de Rouille jaune (sur variété Talent) vient de nous être communiqué dans le Tarn.

Une intervention spécifique contre ces maladies n'est pas justifiée actuellement.

2.- RAVAGEURS ANIMAUX -

Actuellement, on observe des pucerons sur le feuillage (Rhopalosiphum padi, Metopolophium dirhodum). Ces pucerons ne se développent généralement pas sur épis.

Une intervention insecticide n'est donc pas à envisager dans l'immédiat.

- SUR ORGE :

Rhynchosporiose -

Sur les orges tardives, en cours d'épiaison, une application fongicide peut encore être envisagée si la maladie atteint les trois dernières feuilles.

Se reporter au bulletin n° 160 du 1er avril pour le choix d'un produit.

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie,
 Chef de la Circonscription phytosanitaire
 "MIDI-PYRENEES",

J. TOUZEAU.-

Imprimé à la Station d'Avertissements Agricoles de "MIDI-PYRENEES".

Le Directeur-Gérant : P. JOURNET.

C.P.P.A.P. n° 532 A.D.